

患者番号		病棟	テスト病棟	(テスト病)
患者氏名	様	診療科	消化器外科	
生年月日	性別 男	指示医	テスト 医師	印

レジメンNo. 1016071a 適用回数 1 回目 前回投与歴 初回

レジメン名称 ニボルマブ+CAPOX(ホスネツビ<sup>®</sup> タント)

直近レジメン ハム<sup>®</sup>ロリス<sup>®</sup>マブ+TC+Bmab(1回目)(ア<sup>®</sup>レ<sup>®</sup> タント)

直近投与歴 2023/04/10

RpNo	薬剤名/手技/コメント	速度指示 投与量(主単位)	05/10 水 day1	05/11 木 day1	05/12 金 day1	05/13 土 day1	05/14 日 day1	05/15 月 day1	05/16 火 day1
01	点滴 Chemo点滴【薬剤部調製】 200mL/h、(30分)、インラインフィルター使用 テルモ生食 100ml ★オプジーボ	**.*mL/h : **時**分 1袋 360mg 3.6バイアル	23:59						
02	点滴 点滴 全開 生理食塩液 50ml	**.*mL/h : **時**分 1バイアル	23:59						
03	点滴 点滴 200mL/h、(30分) テルモ生食 100ml ゲラセト <sup>®</sup> 静注1mg「アイロム」 デキササート注射液1.65mg/0.5ml ファモチジン静注 20mg 20ml「日新」 ポララミン注 5mg/1ml アロカリス点滴静注235mg 10mL	**.*mL/h : **時**分 1袋 1A 1A 1A 1A 1バイアル	未定						
04	点滴 Chemo点滴【薬剤部調製】(閉鎖式) 250mL/h、(120分) ブドウ糖注 5% 500ml ★オキサリプラチン デキササート注射液1.65mg/0.5ml	**.*mL/h : **時**分 1袋 210.86mg 2A 4.2172バイアル	未定						
05	点滴 点滴 側管プライミング・洗い流し用、【R】ニボルマブ+CAPOX:16071e テルモ生食 100ml	**.*mL/h : **時**分 1袋	未定						
01	カペシタビン錠300mg「ヤクルト」(院外採用) 2 錠 点滴日の夕食後から服用開始 分2 朝夕食後 14日分		●	→	→	→	→	→	→

----- 続き有り -----

身長=160 体重=60 体表面積=1.622

	指示医	確認医	薬剤師

患者番号		病棟	テスト病棟	(テスト病)
患者氏名	様	診療科	消化器外科	
生年月日	性別 男	指示医	テスト 医師	印

レジメンNo. 1016071a 適用回数 1 回目 前回投与歴 初回

レジメン名称 ニホ<sup>®</sup>ルマブ<sup>®</sup>+CAPOX(ホスネツビ<sup>®</sup>タント)直近レジメン ヘム<sup>®</sup>ロリス<sup>®</sup>マブ<sup>®</sup>+TC+Bmab(1回目)(アフレ<sup>®</sup>タント)

直近投与歴 2023/04/10

RpNo	薬剤名/手技/コメント	速度指示 投与量(主単位)	05/10 水 day1	05/11 木 day1	05/12 金 day1	05/13 土 day1	05/14 日 day1	05/15 月 day1	05/16 火 day1
02	デカドロン錠 4mg (2日目) 分1 朝食後	1 錠 1日分	●						
03	デカドロン錠 4mg (3日目) 分1 朝食後	1 錠 1日分	●						
-----続き有り-----									

身長=160 体重=60 体表面積=1.622

	指示医	確認医	薬剤師

患者番号		病棟	テスト病棟	(テスト病)
患者氏名	様	診療科	消化器外科	
生年月日	性別 男	指示医	テスト 医師	印

レジメンNo. 1016071a 適用回数 1 回目 前回投与歴 初回

レジメン名称 ニホ<sup>®</sup>ルマブ<sup>®</sup>+CAPOX (ホスネツビ<sup>®</sup> タント)

直近レジメン ヘム<sup>®</sup>ロリス<sup>®</sup>マブ<sup>®</sup>+TC+Bmab (1回目) (アフレビ<sup>®</sup> タント)

直近投与歴 2023/04/10

RpNo	薬剤名/手技/コメント	速度指示 投与量 (主単位)	05/17 水 day1	05/18 木 day1	05/19 金 day1	05/20 土 day1	05/21 日 day1	05/22 月 day1	05/23 火 day1
01	カペシタピン錠300mg「ヤクルト」(院外採用) 2 点滴日の夕食後から服用開始 分2 朝夕食後	錠 14日分	→	→	→	→	→	→	→
02	デカドロン錠 4mg <2日目> 分1 朝食後	錠 1日分							
03	デカドロン錠 4mg <3日目> 分1 朝食後	錠 1日分							
----- 続き有り -----									

身長=160 体重=60 体表面積=1.622

	指示医	確認医	薬剤師

患者番号		病棟	テスト病棟	(テスト病)
患者氏名	様	診療科	消化器外科	
生年月日	性別 男	指示医	テスト 医師	印

レジメンNo. 1016071a 適用回数 1 回目 前回投与歴 初回

レジメン名称 ニボルマブ+CAPOX(ホスネツビタント)

直近レジメン ハムブロシマブ+TC+Bmab(1回目)(77レビタント)

直近投与歴 2023/04/10

RpNo	薬剤名/手技/コメント	速度指示 投与量(主単位)	05/24 水 day1	05/25 木 day1	05/26 金 day1	05/27 土 day1	05/28 日 day1	05/29 月 day1	05/30 火 day1
01	カペシタビン錠300mg「ヤクルト」(院外採用) 点滴日の夕食後から服用開始 分2 朝夕食後	2 錠 14日分							
02	デカドロン錠 4mg (2日目) 分1 朝食後	1 錠 1日分							
03	デカドロン錠 4mg (3日目) 分1 朝食後	1 錠 1日分							
終了									

身長=160 体重=60 体表面積=1.622

	指示医	確認医	薬剤師