

患者番号		病棟	テスト病棟	(テスト病)
患者氏名	様	診療科	消化器外科	
生年月日	性別 男	指示医	テスト 医師	印

レジメンNo. 1025008a 適用回数 1 回目 前回投与歴 初回
 レジメン名称 GCS (ホスナツピ[®] タント)

直近レジメン ハムブ[®] ロリス[®] マブ +TC+Bmab (1回目) (ア[®] レ[®] タント) 直近投与歴 2023/04/10

RpNo	薬剤名/手技/コメント	速度指示 投与量 (主単位)	05/10 水 day1	05/11 木 day1	05/12 金 day1	05/13 土 day1	05/14 日 day1	05/15 月 day1	05/16 火 day1
01	点滴 点滴 500ml/h (60分) 3-① ソルデム3 A輸液 500ml	**.*mL/h : **時**分 1袋	未定						
02	点滴 点滴 500ml/h (60分) 3-② ソルデム3 A輸液 500ml	**.*mL/h : **時**分 1袋	未定						
03	点滴 点滴 500ml/h (60分) 3-③ 生理食塩液 500ml (点滴用)	**.*mL/h : **時**分 1袋	未定						
04	点滴 点滴 側管①、200ml/h、(30分) テルモ生食 100ml パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイク」 デキサート注射液1.65mg/0.5ml アロカリス点滴静注235mg 10mL	**.*mL/h : **時**分 1袋 1バイア 3A 1バイア	未定						
05	点滴 Chemo点滴【薬剤部調製】(閉鎖式) 側管②、250ml/h、(60分) 生理食塩液 250ml (点滴用) ★シスプラチン	**.*mL/h : **時**分 1袋 40.55mg 4.055バイア	未定						
----- 続き有り -----									

身長=160 体重=60 体表面積=1.622

	指示医	確認医	薬剤師

患者番号		病棟	テスト病棟	(テスト病)
患者氏名	様	診療科	消化器外科	
生年月日	性別 男	指示医	テスト 医師	印

レジメンNo.	1025008a	適用回数	1	回目	前回投与歴	初回
レジメン名称	GCS(ホスネツピ [®] タント)					

直近レジメン $\text{p}^{\text{am}}\text{p}^{\text{m}}\text{r}^{\text{a}}\text{s}^{\text{m}}\text{p}^{\text{a}} + \text{TC} + \text{Bmab}$ (1回目) (ア[®]ピ[®]タント) 直近投与歴 2023/04/10

RpNo	薬剤名/手技/コメント	速度指示 投与量 (主単位)	05/10 水 day1	05/11 木 day1	05/12 金 day1	05/13 土 day1	05/14 日 day1	05/15 月 day1	05/16 火 day1
06	点滴 Chemo点滴【薬剤部調製】(閉鎖式) 側管③、200ml/h、(30分) テルモ生食 100ml ★ゲムシタビン	**.*mL/h : **時**分 1袋 1622mg	未定						
07	点滴 点滴 側管プライミング・洗い流し用【R】GCS:25008a テルモ生食 100ml	**.*mL/h : **時**分 1袋	未定						
01	エスワンタイホウ配合OD錠 T20 (ティーエワン) 2錠 エスワンタイホウ配合OD錠 T25 (ティーエワン) 2錠 分2 朝夕食後 80mg/m ² /日 点滴日の夕食後から内服開始	錠 錠 7日分	●	→	→	→	→	→	→
----- 続き有り -----									

身長=160 体重=60 体表面積=1.622

	指示医	確認医	薬剤師

患者番号

病棟 テスト病棟 (テスト病)

患者氏名

様

診療科 消化器外科

生年月日

性別 男

指示医 テスト 医師

印

レジメンNo. 1025008a

適用回数 1 回目

前回投与歴 初回

レジメン名称 GCS (ホスナツピ°タント)

直近レジメン ヘムブ°ロリス°マブ°+TC+Bmab(1回目)(77°レ°タント)

直近投与歴 2023/04/10

RpNo	薬剤名/手技/コメント	速度指示 投与量 (主単位)	05/17	05/18	05/19	05/20	05/21	05/22	05/23
			水 day1・	木 day1・	金 day1・	土 day1・	日 day1・	月 day1・	火 day1・
01	エスワンタイホウ配合OD錠 T20 (77°レ°タント) 2 錠 エスワンタイホウ配合OD錠 T25 (77°レ°タント) 2 錠 分2 朝夕食後 7日分 80mg/m ² /日 点滴日の夕食後から内服開始								
	終了								

身長=160 体重=60 体表面積=1.622

指示医

確認医

薬剤師